

പുകയില ഉപയോഗവും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും

ഡോ. പി.എൻ. സുരേഷ്‌കുമാർ
ചൈരൽ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി
കെ.എം.സി.ടി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്

മാനവരാശിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായി പുകയിലയെ നമുക്ക് വിശ്വാസിപ്പിക്കാം. മനുഷ്യജന്യ സാംകൊമിക രോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശുരൂതരമായത് പുകവലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുപ്രകാരം ഈ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും 8 സെക്കന്റിൽ ഒരാൾ പുകവലിജന്യമായ രോഗങ്ങൾക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ 49 ലക്ഷം ജനങ്ങൾ. പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം ഇപ്പോഴുള്ളതുപോലെ തുടർന്നാൽ അടുത്ത 25 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് മൂന്നിരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കും. അതായത് 3 സെക്കന്റിൽ ഒരാൾവീതം മരിക്കും.

പുകവലി സാധാരണ തുടങ്ങുന്നത് 13 വയസിനും 18 വയസിനും ഇടയ്ക്കാണ്. 18 വയസുവരെ പുകവലി ശീലിക്കാത്തവർ പുകവലിക്കാരനാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അതിനാൽ ഈ ശീലം കുരുനിലെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പുകയില ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പക്കാരം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുണ്ട്. പുകയില കൂട്ടി മുറുക്കലും സിഗര്റ്റ്, ബീഡി, ചുരുട്ട്, റൂക്ക എന്നീ വിധങ്ങളിലുള്ള പുകവലി, മുക്കുപൊടി എന്നിവ സർവ്വസാധാരണമാണ്.

ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പ്രചാരണത്തിലായിട്ടുള്ളതാണ് പുകയില ചേർത്ത് ചവകുന്ന പല നിരത്തിലും മന്ത്രത്തിലും പേരിലുമുള്ള പാൻമസാലകൾ (ഹാൻസ്, കൈനി എന്നിവ). ലോകത്ത് ഇതുവരെയുണ്ടായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ എത്രപേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൽ കുടുതൽ ആളുകൾ ഇത്തെങ്കിലും കാലയളവിൽ പുകയിലജന്യമായ രോഗങ്ങൾക്കൊണ്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എന്ന് കണക്കുകൾ സുചിപ്പിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ കണക്കുപ്രകാരം പുകയില ഉപയോഗംമുലം 350 ലക്ഷം പേരുകൾ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അവ ഇപ്പോൾ മാത്രം കൗൺസിൽ നിർബന്ധമാണ്.

ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ	- 225 ലക്ഷം
ഹൃദ്ദോഗം	- 60 ലക്ഷം
കൈകാലുകളിലെ ധമനി രോഗങ്ങൾ	- 40 ലക്ഷം
തള്ളവാതം	- 5 ലക്ഷം
കാൻസർ	- 5 ലക്ഷം
മറ്റു രോഗങ്ങൾ	- 15 ലക്ഷം

പുകയിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ മുലം ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ വർഷവും 7 ലക്ഷം പേര് മരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ഏറ്റവും കുടുതൽ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്വാസകോശരോഗങ്ങൾ മൂലമാണ്. സിഗരറ്റിന്റെയും ബീഡിയുടെയും പുകയിലെ ഏതാണ്ട് നാലായിരം രാസവസ്തുകൾ അടങ്കിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ടാർ, നികോട്ടൈൻ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, ഹൈഡ്രജൻ സൈബൈഡ്, ഹോർമോൺസി ഫൈഡ്, മിനോർ, പോളിഅരോമാറ്റിക് ഫൈഡോകാർബൺ എന്നിവയാണ്. ഇവയിൽ നികോട്ടൈൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടകാരി. 60 mg നികോട്ടൈൻ അക്കരതുപോ

യാൽ മരണംവരെ സംഭവിക്കാം. ഒരു സിഗരറ്റിൽ 4 mg നികോട്ടിൻ ഉണ്ട്. ഒരു സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പോൾ 1.5 mg നികോട്ടിൻ അകത്തുപോകുന്നു. അത് ഹൃദയത്തിൽ ശക്തമായ നാല് അഥവാ മർദ്ദം കൊടുത്തിട്ട് തലച്ചോറിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അല്പപസമയ തേക്ക് ഒരു ഉരുളശം അനുഭവപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് അത് കോസ്റ്റിനിൽ ആയി മുത്രത്തിൽ കൂടി വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു. നികോട്ടിൻ ദേഹത്തുനിന്നും വെളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടാം. അപ്പോൾ പുകവലിക്കാൻ അടുത്ത സിഗരറ്റ് കത്തിക്കുന്നു. കാരണം നികോട്ടിൻ ആസക്തിയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്. ഈ നികോട്ടിൻ ആൺ ഹൃദയാഗ്നങ്ങൾക്കും തളർവാതത്തിനും കാരണമാകുന്ന മുഖ്യപ്രതി. 50 വയസിൽ താഴെയുള്ള പുരുഷരാൽ ഹൃദയാഗംമുലം മരണം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ മുഖ്യകാരണം പുകയിലതനെന്നയാണ്.

പുകയിലയിലുള്ള ടാറിൽ 40-ൽ അധികം രാസവസ്തുകൾ ഉണ്ട്. അവയിൽ പലതും കാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ്. ഇത്തരം കാൻസർ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ അവയ വങ്ങളെല്ലായും ബാധിക്കും. അവയിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരി ശാസകോശ അർഭവുദങ്ങളാണ്. ലോകത്താകമാനം ഉണ്ടാകുന്ന മരണത്തിൽ 10% കാൻസർ രോഗമുലമാണ്. പുരുഷരാറിൽ 52% വും സ്ത്രീകളിൽ 16%വും ഉണ്ടാകുന്ന കാൻസർ പുകയില മുലമാണ്. ഇപ്പോഴുള്ളതിൽ മുന്നിലെഡാന് കാൻസർ പുകയില ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കിയാൽ തടയാൻ കഴിയും. ശാസകോശ കാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നവരിൽ 90% പേരും പുകവലിക്കാരാണെന്ന പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ശാസകോശ കാൻസറിന് കാര്യമായ ചികിത്സയൊന്നുമില്ലാത്തതുകാണ്ട് മരണം നിശ്ചയമാണ്. വായിൽ കാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാനകാരണം പുകയില കൂട്ടിയുള്ള മുറുക്കൽ, ഹാൻസ്, പാൻമസാല എന്നിവയുടെ ഉപയോഗമാണ്. പുകയില ചവയ്ക്കുന്നവരിലെ വായിലെ കാൻസറിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ വായിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു വെള്ളത്ത് പാടാണ്. ഇതിനെ ലുക്കോപ്പേക്കിയ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ സമയത്ത് തന്നെ പുകയില ശീലം നിർത്തി മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ കാൻസർ വരാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. എന്നാൽ പുകയില തുടർന്നു ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ വെള്ളത്ത് പാട് കല്ലിച്ച് അരിന്പാറ പോലെയാകും. അപ്പോഴും പുകയില ശീലം നിർത്തി മരുന്നു കഴിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടാം. അതു ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വായിലും നാക്കിലും കവിളിലുമൊക്കെ കാൻസർ വ്യാപിച്ച് വലിയ വേദന സഹിച്ച് മരിക്കേണ്ടിവരും.

ஸிறார்த்திலே பூக்குலியுதை மரைாரு அபக்கக்காரியான் கார்வன் மோளோக்ஸெய். கத்திரின்ட் பிரயான ஜோலி ஶரீரத்தின்ட் ஏலூா அவயவங்களுடைய பொள்வாயு ஏத்திக்கூக் ஏற்றதான். பூக்குலியுதை கார்வன் மோளோக்ஸெய் கத்திரிலே பொள்வாயுவிடை நிர்வீரியமாக்குங்கு. கத்திரின்ட் கடி வர்விப்பிச்சு கதயோடு குரு ய்க்குங்கு. அதுமூலம் காலிலேய்க்கும் கைவிரலுக்குலேய்க்குமுதை கதயோடு நிலத்து அதோடு மூலமாகும். அவைகளை காலுக்கர முடிகிற தாசைவெழுப்பு கைவிரலுக்கும் மருப்பு முரிசூமாரேஷ அவசியதில் ஏத்திசேருங்கு. தேராங்கோ அஞ்ஜெஜ்டின் வெளிர்தான்ஸ் என்கான் ஹா அவசியதை பிரயுங்கத்.

గරിബിനികൾ പുകവലിച്ചാൽ രക്തസ്രാവം, ഗർഭം അലസൽ, മാസംതികയാൽ യുള്ള പ്രസവം, കുഞ്ഞിന് ഭാരക്കൂറവ്, വളർച്ചക്കൂറവ്, ആരോഗ്യക്കൂറവ്, പ്രതിരോധയശേഷിക്കൂറവ്, ശാസനക്കോശരോഗങ്ങൾ, അംഗവൈകല്യങ്ങൾ എന്നതിനു പുറമേ സ്വീച്ഛിമാദ്യം, ശ്രദ്ധക്കൂറവ്, അമിത പിരുപിരുപ്പ് (എഡി.എച്ച്.ഡി.) തുടങ്ങിയവയും ഉണ്ടാകാം. പുകവലിക്കാർക്കെപ്പും കഴിയേണ്ടിവരുന്ന പുകവലിക്കാത്തവർക്കും ഈ പുക ശമനിക്കേണ്ടിവരുന്നതുകൊണ്ട് മേൽപ്പറിഞ്ഞ അസുഖങ്ങളാക്കെ അവർക്കും പിടിപെടാം. ഇതിനെ നിഷ്കരിയ പുകവലി എന്ന് പറയുന്നു. ഈ കാരണംകൊണ്ടാണ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും

വാഹനങ്ങളിലും മറ്റും പുകവലി നിയമം വഴി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുകവലിക്കാത്ത വർക്ക് ശുദ്ധവായു ശവസിക്കാനുള്ള അവകാശം സംരക്ഷിക്കാനും അവരുടെ ആരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കാനും ഈ നിയമം ധമാവിധി നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് അതിപ്രധാനമാണ്.

പുകയിലയുടെ വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള ഉപയോഗത്തിന് അടിമപ്പടിട്ടുള്ളവർ മരണത്തിന്റെ കരാളപദ്ധതിൽ അമരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശാസ്ത്രീയമായി ചികിത്സക്ക് വിധേയരാകണം. പുകവലി പൊടുനെന നിർത്തുന്നോഴുള്ള അസ്വസ്ഥത കുറയ്ക്കുവാനും പുകയിലയോടുള്ള ആസക്തി കുറയ്ക്കുവാനുമുള്ള നിരവധി മരുന്നുകൾ ഈ ലഭ്യമാണ്. നികോട്ടിൻ ചുയിംഗം, നികോട്ടിൻ പാച്ച്, ബുദ്ധോഹിയോൻ, വാരിൻ ക്രീനി എന്നീ മരുന്നുകൾ പുകയില ഉപയോഗം നിർത്താൻ വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇത്തരം മരുന്നുകളുടെ ഒപ്പംതന്ന രോഗിയുടെ ജീവിതത്തെലിയും സഭാവസ്വിശേഷതകളും കണക്കിലെടുത്ത് വ്യക്തിഗത കൗൺസിലിങ്ങും, പെരുമാറ്റങ്ങൾ ശരിയാക്കിയെടുക്കാനുമുള്ള വിഹോദിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ തെറാപ്പിയും നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

ഇതിൽനിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ പുകയില സമൂഹത്തിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വസ്തുതനെന്നയാണ് എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്ന കേന്ദ്രഗവൺമെന്റ് 2004 മെയ്മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി മുതൽ ഇന്ത്യയിലെടാക്ക പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കിയ ഒരു പകയില നിയന്ത്രണ നിയമം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നിയമപ്രകാരം പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും പൊതുവാഹനങ്ങളിലും പുകവലി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുകവലി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പരസ്യവും കലാകാരിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ പുകയില കമ്പനികളുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് പുകയില ഉല്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതും കൂറുമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ചു മാത്രമേ പുകയില ഉല്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാവുന്ന കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാവു എന്നും നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു. ഈ നിയമം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കിയാൽ പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം ശഞ്ചമായി കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. അതെത്തിൽ പുകയില വിമുക്തമായ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

** /*/**